

AUGMENTATION DES MOLLETS PAR POSE D'IMPLANTS

Indication : Augmentation du volume et de la projection des mollets

Cicatrices : Cicatrices de quelques centimètres sous le pli poplité (creux du genou)

Détail de l'intervention

-Anesthésie générale

-Durée de l'intervention : 1h00 à 2h00 selon les cas

-Durée d'hospitalisation : 24 à 48 heures

-Durée de convalescence et de soins : 14 jours

-Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines

-Soins : Consultation avec le chirurgien à 15 jours post-opératoire

Douche et pansements quotidiens

Injection d'anticoagulants par voie sous cutanée 7 à 15J

Infirmière à domicile si besoin

Principaux risques spécifiques

Rotation de l'implant, insuffisance de résultat

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Exceptionnellement dans certaines indications post-traumatiques, ou dégénératives, sous réserve d'accord de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (Polyomyélite)

Gestes pouvant être associés :

Liposculpture

A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, mammographie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS

Résultats :

Cicatrisation en 14 jours

Forme des fesses après 3 à 6 mois

Aspect cicatrice 18 à 24 mois

Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.

2ème temps et retouches possibles à distance

Durée de vie des implants variable à évaluer tous les 10 ans