


CURE DE PTOSE MAMMAIRE OU MASTOPEXIE

Indication : Traitement du relâchement cutané (excès de peau)

Cicatrices : Cicatrices en encre de marine, ou en I.



Détail de l'intervention

-Anesthésie générale

-Durée de l'intervention : 1h30 à 2h30 selon les cas

-Durée d'hospitalisation : 24 à 48 heures

-Durée de convalescence et de soins : 15 à 21 jours

-Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines

-Soins : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine

Douche et pansements quotidiens

Infirmière à domicile si besoin

Port d'un soutien gorge de contention durant 4 semaines

Principaux risques

Cicatrices, lymphorée, hématome, nécrose, infection, asymétrie

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible en cas de réduction mammaire associée (au moins 300g de chaque côté)

Dans le cas contraire aucune.

Gestes pouvant être associés : Pose d'implants mammaires ou greffe adipocytaire (lipoféeling, liposculture) si le volume est insuffisant.

A faire avant l'intervention : bilan sanguin, consultation d'anesthésie, mammographie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS

Résultats : Cicatrisation en 21 jours

Forme du sein après 3 à 6 mois

Aspect cicatrice 18 à 24 mois

Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.

2ème temps et retouches possibles à distance