

GYNECOMSATIE

Indication : Réduction du volume de la glande mammaire chez l'homme réalisée après la puberté

Cicatrices: Hémi-aréolaire inférieure ou trans-thoraciques selon l'excès cutané



Détail de l'intervention

- Anesthésie générale
- Durée de l'intervention : 00h30 à 1h30 selon les cas
- Durée d'hospitalisation : 24 à 48 heures
- Durée de convalescence et de soins : 7 à 14 jours
- Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines
- Soins : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine
 - Douche et pansements quotidiens
 - Infirmière à domicile si besoin
 - Port d'un Boléro de contention durant 2 semaines

Principaux risques

Cicatrices chéloïdes, asymétrie

Prise en charge par l'Assurance Maladie

En cas d'ordre sexuel ou psychologique après avoir éliminé une cause primitive

A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, mammographie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS, Bilan endocrinien à la recherche d'une cause primitive

- Résultats :**
- Cicatrisation en 7 à 14 jours
 - Résorption des ecchymoses en 10 jours
 - Aspect définitif au bout de 6 mois
 - Aspect cicatrice 18 à 24 mois
 - Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.
 - 2ème temps et retouches possibles à distance