

LIFTING BRAS

Indication : relâchement cutané du bras (exérèse de peau et de graisse)
Cicatrices Cicatrices de l'aisselle au pli du coude (cf schéma)



Détail de l'intervention

- Anesthésie générale
- Durée de l'intervention : 1h30 à 2h30 selon les cas
- Durée d'hospitalisation : 48 à 72 heures
- Durée de convalescence et de soins : 15 à 21 jours
- Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines
- Soins : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine
 - Douche et pansements quotidiens
 - Infirmière à domicile si besoin
 - Pas de port de vêtement compressif

Principaux risques

Cicatrices, lymphorée, hématome, nécrose, infection, asymétrie ...

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible si le relâchement cutané est conséquent
Envoi d'une entente préalable à la sécurité sociale
Décision donnée par le médecin conseil
En cas de prise en charge par la sécurité sociale : frais d'hospitalisation pris en charge, possibilité d'arrêt de travail, prise en charge des soins infirmiers, possibilité de remboursement par mutuelle si honoraires chirurgicaux

Geste pouvant être associé : Lipoaspiration

A faire avant l'intervention : bilan sanguin, consultation d'anesthésie,
Arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS

Résultats : Cicatrisation en 21jours
Œdème 3 à 6 mois
Aspect cicatrice 18 à 24 mois
Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.
2ème temps et retouches possibles à distance