


MAMMECTOMIE ou MASTECTOMIE TRANS-IDENTITAIRE

Indication : Réduction du volume de la glande mammaire chez le patient trans-identitaire

Cicatrices: Hémi-aréolaire inférieure ou trans-thoraciques selon l'excès cutané



Détail de l'intervention

- Anesthésie générale
- Durée de l'intervention : 00h30 à 2h30 selon les cas
- Durée d'hospitalisation : 24 à 48 heures
- Durée de convalescence et de soins : 7 à 21 jours
- Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines
- Soins : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine
 - Douche et pansements quotidiens
 - Infirmière à domicile si besoin
 - Port d'un Boléro de contention durant 2 à 4 semaines

Principaux risques

Cicatrices chéloïdes, asymétrie, insuffisance résultat

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible en cas d'accord du psychiatre, de l'endocrinologue et d'obtention de l'ALD 31.

En cas de prise en charge par la sécurité sociale : frais d'hospitalisation pris en charge, possibilité d'arrêt de travail, prise en charge des soins infirmiers, possibilité de remboursement par mutuelle si honoraires chirurgicaux

A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, mammographie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS.

Résultats : Cicatrisation en 7 à 14 jours

Résorption des ecchymoses en 10 jours

Aspect définitif au bout de 6 mois

Aspect cicatrice 18 à 24 mois

Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.

2ème temps et retouches possibles à distance