

# NYMPHOPLASTIE DE REDUCTION OU CHIRURGIE DES PETIES LEVRES

**Indication :** Taille excessive des petites lèvres qui font saillie et dépassent de la fente vulvaire

**Cicatrices:** A la face interne des petites lèvres

## Détail de l'intervention

- Anesthésie locale** ou générale si besoin
- Durée de l'intervention** : 30 à 45 minutes selon les cas
- Durée d'hospitalisation** : Ambulatoire
- Durée de convalescence et de soins** : 5 à 10 jours
- Reprise des activités sportives et sexuelles** : 4 à 6 semaines
- Soins** : Consultation avec le chirurgien à 15 jours post-opératoire pour contrôler la cicatrisation
  - Douche quotidienne
  - Serviette absorbante 5 jours

## Principaux risques

Désunion de cicatrice

## Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible en cas d'accord du psychiatre, de l'endocrinologue et d'obtention de l'ALD 31.

En cas de prise en charge par la sécurité sociale : frais d'hospitalisation pris en charge, possibilité d'arrêt de travail, prise en charge des soins infirmiers, possibilité de remboursement par mutuelle si honoraires chirurgicaux

## Gestes pouvant être associés :

Vaginoplastie, liposculpture des grandes lèvres

## A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS.

## Résultats

- Cicatrisation en 14 jours
- Résorption des ecchymoses en 10 jours
- Aspect définitif au bout de 6 mois
- Aspect cicatrice 18 à 24 mois
- Sensibilité peut être altérée durant plusieurs semaines
- 2ème temps et retouches possibles à distance