

# PENOPLASTIE OU PHALLOPLASTIE ESTHETIQUE

**Indication : Augmentation de la taille de la verge en longueur et/ou en circonférence**

**Cicatrices: Pubiennes en Y dans la zone pileuse**

## Détail de l'intervention

- Anesthésie générale
- Durée de l'intervention: 1 à 2 heures
- Durée d'hospitalisation : Ambulatoire
- Durée convalescence et de soins : 5 à 10 jours
- Reprise des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines
- Soins : Consultation avec le chirurgien à 15 jours post-opératoire pour contrôler la cicatrisation
  - Douche quotidienne
  - Compresse absorbante 5 jours

## Principaux risques

Désunion de cicatrice

## Prise en charge par l'Assurance Maladie

Jamais

## A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, arrêt tabac (3 semaines avant), aspirine, AINS.

## Résultats : Cicatrisation en 14 jours

- Résorption des ecchymoses et œdème en 1 mois
- Aspect définitif au bout de 6 mois
- Aspect cicatrice 18 à 24 mois
- Sensibilité peut être altérée durant plusieurs semaines
- 2ème temps et retouches possibles à distance