PLASTIE ABDOMINALE

Indication : relâchement cutané abdominal (exérèse de peau et de graisse)
Cicatrices sus ombilicale et périombilicale





Détail de l'intervention

-**Anesthésie générale**
-**Durée de l'intervention** : 1h30 à 2h30 selon les cas
-**Durée d'hospitalisation** : 48 à 72 heures
-**Durée convalescence et de soins** : 15 à 21 jours
-**Reprise des activités sportives et sexuelles :** 4 à 6 semaines
-**Soins** : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine
Douche, injection d'anticoagulants et pansements quotidiens
Infirmière à domicile si besoin
Port d'une gaine abdominale si cure de diastasis (6 semaines)

Principaux risques spécifiques

Risque thrombo-embolique (phlébites, embolie pulmonaire…), cicatrices, lymphorée, hématome, nécrose, infection

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible si le tablier abdominal recouvre le pubis
Envoie d'une entente préalable à la sécurité sociale
Décision donnée par le médecin conseil de l'Assurance Maladie
En cas de prise en charge par la sécurité sociale : frais d'hospitalisation pris en charge, possibilité d'arrêt de travail, prise en charge des soins infirmiers, possibilité de remboursement par mutuelle si honoraires chirurgicaux

Gestes pouvant êtres associés : Lipoaspiration, cure de diastasis, bodylift (plastie abdominale circulaire)

A faire avant l'intervention : bilan sanguin, consultation d'anesthésie**,** arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS…

Résultats : Cicatrisation en 21jours
Œdème 3 à 6 mois
Aspect cicatrice 18 à 24 mois
Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.
2ème temps et retouches possibles à distance

Professeur David Boccara - Chirurgien Esthétique
Hôpital Saint-Louis - 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
06. 50. 86. 02. 29
secretariatprboccara@hotmail.com